



IMC - Medical Grade Cannabis Oil שמן קנאביס רפואי زيت الحشيش الطبي					Each Drop Contains כל טיפה מכילה كل نقطة تحتوي على	
		THC %	CBD %	CBN %	THC mg	CBD mg
T0/C24	CBD Rich	0	24	<1.5	<0.16	7.68
T1/C20	CBD Rich	1	20	<1.5	0.32	6.4
T3/C15	CBD Rich	3	15	<1.5	0.96	4.8
T5/C10	CBD Rich	5	10	<1.5	1.6	3.2
T10/C10	THC/CBD Balanced	10	10	<1.5	3.2	3.2
T5/C5		5	5	<1.5	1.6	1.6
T10/C2	THC Rich	10	2	<1.5	3.2	0.64
T15/C3	THC Rich	15	3	<1.5	4.8	0.96
T20/C4	THC Rich	20	4	<1.5	6.4	1.28

IMC - Medical Grade Cannabis Inflorescences תפרחות קנאביס רפואי زهرة القنب الطبية					Average Concentration ריכוז ממוצע متوسط التركيز	
		CBN %	CBD %	THC %		
		<1.5	24	0	CBD Rich	T0/C24
		<1.5	20	1	CBD Rich	T1/C20
		<1.5	15	3	CBD Rich	T3/C15
		<1.5	10	5	CBD Rich	T5/C10
		<1.5	10	10	THC/CBD Balanced	T10/C10
		<1.5	5	5		T5/C5
		<1.5	2	10	THC Rich	T10/C2 Sativa/Indica
		<1.5	3	15	THC Rich	T15/C3 Sativa/Indica
		<1.5	4	20	THC Rich	T20/C4 Sativa/Indica

قنب طبيّ

مواد فعّالة

يُمنع تجاوز التوصية بخصوص طريقة الإعطاء التي عُرفت للمنتج، مثلاً: يُمنع بلع الأزهار. بلع أزهار القنب قد يؤدي إلى أعراض جانبية شاذة. يجب القراءة والاهتمام بالتقييدات وشروط الترخيص كما يظهر في رخصة الاستعمال والامتلاك لدى المتعالج. هذه النشرة لا تشكل بديلاً لمحادثة مع الطبيب، الصيدلي أو مندوب عن مركز الإرشاد.

1. لم أعد القنب الطبيّ؟

دواعي الاستعمال الطبيّة هي تحت الاستثناءات ذات الصلة المفصلة في البند 106 التابع لوحدة القنب الطبيّ في وزارة الصحة.

2. قبل استعمال القنب الطبيّ

✗ يُمنع استعمال المنتج إذ:

- وجدت لديك حساسية للمواد الفعّالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها المنتج، أو إذا تطوّرت لديك حساسية أثناء استعمال المنتج.
- كنت حاملاً، تخططين أن تحملي أو مرضعة.
- كنت تعاني من ذهان نشط أو وراثه عائلية (من الدرجة الأولى) لأمراض ذهانية.
- يُمنع استعمال هذا المنتج في الظلام.

! تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال المنتج:

- **مرض السكرى** - قد يؤدي استهلاك القنب إلى هبوط في مستويات السكر في الدم. يوصى التزوّد بوجبة خفيفة أو حلوى أو مشروب خفيف بارد ومُحلى قبل بدء الاستعمال. يوصى بإجراء مراقبة لمستويات السكر عند بدء الاستعمال.
- **للمرضى الذين يعانون من سرطان في الكبد (Hepatoma)** - يوصى بعدم استعمال مُنتج القنب الذي يحتوي على THC.
- **إساءة الاستعمال (abuse)** وتطوّر قدرة تحمل/إدمان على القنب - يجب حثلية الطاقم الطبيّ إذا كنت تحتاج إلى جرعات متزايدة أكثر وأكثر من القنب لتحسين حالتك الطبيّة.

قبل العلاج بالقنب أخبر الطبيب إذ:

- كنت تعاني من مرض في القلب أو الأوعية الدموية مثل: قصور في عمل

تحتوي نبتة القنب على أكثر من 500 مركب كيميائيّ. المواد الفعّالة مصنّفة بحسب تركيز كانابينويدات من نوع CBD و-THC (موجب التسجيل الموجود على العبوة).

معروف اليوم أيضاً مركبات إضافية، تيربينات وفلافونويدات، التي على ما يبدو لها أيضاً أهمية علاجية، لكن المعرفة البحثية بخصوص تأثير الفارماكولوجي أقل بكثير.

حتى اليوم، تتم ملائمة المنتجات لكل متعالج بحسب تركيز المواد الفعّالة وطبيعة التركيبة (ساتيڤا/إنديكا أو هجين).

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال المنتج. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن المنتج. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطاقم الطبيّ.

عند الاستعمال لأول مرّة ولكل سؤال يتعلق في استعمال القنب الطبيّ يوصى بالاتصال مع مركز الإرشاد التابع لشركة بازيلت فارما، على هاتف رقم 072-2747870

هذا الدواء وصف لك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

مُنتج القنب معرّف كمخدر خطير الذي يُحظر استعماله إلا إذا أعطي لذلك ترخيص بشكل قانوني. حيازة ومكان استعمال القنب لأهداف طبيّة هو بموجب أنظمة وحدة القنب الطبيّ التابع لوزارة الصحة (رقم مرجعي 48046317: تحديث شروط رخصة الحيازة ومكان استعمال القنب لأهداف طبيّة - وحدة القنب الطبيّ، وزارة الصحة).

يُمنع تمامًا استعمال مخدر خطير بوجود قاصرين أو بشكل علني. يُمنع إخراج مخدر خطير أو منتجاته من إسرائيل بدون إذن خاص.

عند استعمال مُنتج القنب من نوع أزهار على شكل لفائف (سجائر) للتدخين، يجب اتخاذ جميع وسائل الحذر المطلوبة عند استعمال النار

ظهور حالة من تسارع دقات القلب (tachycardia) أو ارتفاع ضغط الدم.

- مضادات التخثر التي تحتوي على وارفارين (كومادين) - من المحتمل حصول ارتفاع في مؤشرات INR.
- مستحضرات موضعية لخفض الضغط داخل العين (جلوكوما).
- أدوية لزيادة القدرة الجنسية - من المحتمل ازدياد خطر حدوث نوبات قلبية.
- مضادات حيوية لعلاج حالات العدوى الجلدية - حمض الفوسيديك.
- أدوية لعلاج HIV.
- أدوية لعلاج الصرع - فالبروات، توبيرامات، روفيناميد، كلوبازام، زونيساميد، كاربامازيبين.
- أدوية ذات تأثير مضاد للكولين (مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مضادات الهيستامين التي تُستعمل ضد الحساسية) - من المحتمل حدوث ارتفاع في احتمال ظهور تسارع دقات القلب (tachycardia)، دوار وهوس.

- أزيلاستين - لعلاج الحساسية في العينين.
- مستحضرات أمفيتامينية أو مشتقاتها - مستحضرات لتخفيف الوزن، لاضطراب الإصغاء والتركيز وحتى علاجات الأسنان (أدريالين الذي يُستعمل أحياناً للتخدير) - قد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم ووتيرة قلب سريعة.

تفصيل إضافي لأدوية التي ممكن أن تؤثر، أو أن تتأثر من عملية تحلل القنب في الجسم:

باربيتورات، كاربامازيبين، انزولتاميد، فينوباربيتال، فنتونين، بريمدون، ريفابوتين، ريفامبين، هيبركوم، كلاريثروميسين، سايلكلوسبورين، دارونافير، أيريثروميسين، إيتراكونازول، كيتوكونازول، لوبينافير، ميفيستون، أوميتاسفير، باريتاثيرفير، ريتونافير، ساكونافير، فيراپاميل، فوريكونازول، أميودارون، كلوبيدوجريل، فلوكونازول، فلوروأوراسيل، ميترونيدازول، سالفاميثوكسازول، كلورامفينيكول، إيفافيرنز، أيزوميبرازول، فلوأوكسيتين، فلوأوكسامين، إيزونازيد، مودافينيل، أوميفرازول، أوكسكاربازيبين، ثيوفيلين، كافيين، كلوزابين، دولوكستين، أسترايول، استروجين، ليدوكاين، ميلاتونين، ميكسليت، ميرتازابين، أولانزابين، بروبرانولول، رسيجيلين، روبينيرو، تريامتين، زولميترينتان. :

نظراً إلى أن المعلومات المتعلقة بدمج القنب الطبي مع أدوية لم يتم تأسيسها بعد بصورة كافية على دراسات طبية منتظمة، في كل حالة تواجه فيها عرضاً جانبياً، الذي ممكن أن يكون ناتجاً عن أي دمج مع دواء، مع استعمال القنب الطبي، يوصى بإبلاغ طبيبك واتخاذ الحذر.

إذا كنت تتناول دواء معيناً، يُمنع التوقف عن تناوله أو تغيير جرعته بدون استشارة طبيب.

استعمال المنتج والغذاء

- يجب الامتناع عن شرب عصير الجريبفروت خلال فترة استعمال القنب.
- يوصى بتناول وجبة طعام خفيفة، نصف ساعة تقريباً بعد تناول المنتج.
- استهلاك القنب قد يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم وإلى شعور بالتعب والدوار. من المستحسن عدم تناول قنب على معدة فارغة.
- يوصى التزود بوجبة خفيفة/حلوى أو مشروب محلى قبل تناول المنتج.

استعمال المنتج واستهلاك الكحول

يُمنع شرب النبيذ أو مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بالقنب، خاصة عند

القلب، ذبحة صدرية، نوبة قلبية في السابق، ضغط دم مرتفع غير منضبط أو مشكلة في معدل وتيرة القلب أو النبض، أو إذا لوحظت تغييرات في النبض وفي ضغط الدم بعد بدء العلاج.

- كنت تعاني من مرض كبد أو كلي.
- كنت تعاني من ذهان فعال، أو إذا أصبت في الماضي بحالة ذهان.
- كنت تعاني من اضطراب قلبي.
- كانت لديك حالة نفسية وراثية خطيرة لدى قريب عائلة من الدرجة الأولى، خاصة إذا كنت تبلغ أقل من 30 عاماً.
- كان لديك تاريخ من الإدمان على الدواء أو مادة ما أو إساءة استعمال المخدرات.
- كنت تواجه صعوبة في تنفيذ فعاليات يومية مثل تحضير الطعام والمشروبات الساخنة.
- كنت تعاني من ذهان أو اضطراب ثنائي القطب.
- كنت تتناول أدوية إضافية أو مكملات غذائية..

التدخين

لا يوصى بخلط القنب مع الدخان العادي خوفاً من إصابة بنجاعة العلاج.

فحوصات ومتابعة

- يُشترط إعطاء رخصة بإجراء متابعة طبية كل ثلاثة أشهر على الأقل في سنة العلاج الأولى، من قبل طبيب معالج، الذي يتم شمل تفاصيله في الرخصة، وابتداءً من سنة العلاج الثانية - على الأقل كل ستة أشهر.
- إذا كنت تتناول فالبروات (لعلاج الصرع)، سوياً مع القنب، يوصى أيضاً بمراقبة أداء عمل الكبد أثناء الاستعمال المدموج مع القنب.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية فأخبر الطبيب أو الصيدلي قبل الاستعمال. سيُقدر الطبيب حجم الإمكانية لحدوث تفاعلات، وسيُحدد إذا كان النتيجة معنى سريري الذي يتطلب الاهتمام قبل أن يصادق على العلاج المدموج، أو سيطلب إجراء مراقبة، ملاءمة الجرعات، إيقاف العلاج أو وسائل حذر أخرى. أخبر الطبيب بشكل خاص إذا كنت تتناول:

- أدوية مُثبطة لجهاز الأعصاب المركزي، مثل أدوية لاضطرابات النوم، للتهدة، مضادة للقلق ولامضطرابات ذهانية، مسكنات ألم (خاصة مسكنات الألم الأفيونية). هذه الأدوية ممكن أن تزيد من تأثير التهدة واسترخاء العضلات، وأن تؤدي على ارتفاع في خطر حالات السقوط وحوادث أخرى. الاستعمال سوياً مع المسكنات الأفيونية ممكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع في احتمال كبت التنفس.
- أدوية استرخاء عضلي مثل باكوفين أو بنزوديازيبينات. قد يحدث انخفاض في متانة وقوة العضل، الذي يؤدي إلى خطر متزايد لحالات السقوط.
- أدوية لخفض مستويات الجلوكوز في الدم - قد يحدث انخفاض مفرط في قيم الجلوكوز في الدم، وحاجة إلى ملاءمة جرعاتها مع بدء العلاج أو تغيير العلاج بالقنب.
- أدوية لخفض ضغط الدم - قد يحدث انخفاض مفرط في قيم ضغط الدم والحاجة لملاءمة الجرعات.
- أدوية ذات تأثير محاكي الودي (وهذا يشمل مستحضرات لعلاج موضعي للعين أو الأنف التي هي ذات مقدرة امتصاص جهازية) - ازدياد احتمال

يجب تنقيط عدد القطرات المرغوب على ملعقة. يجب إمساك القنينة بشكل عامودي (90 درجة) من الملعقة للتنقيط بصورة دقيقة. زيت القنب هو سائل لزج ويمكن أن يكون التنقيط بطيء نسبياً. يجب إدخال الملعقة في الفم تحت اللسان وإخراجها ببطء. بعد تناول، يجب الانتظار تقريباً 1-2 دقائق قبل بلع اللعاب لإتاحة الإمكانية للزيت أن يمتص. يجب الانتظار 15 دقيقة تقريباً قبل الشرب أو تناول طعام. سيتم الإحساس بالتأثير بعد نصف ساعة تقريباً حتى ساعة. من المحتمل أن يتم الإحساس بالتأثير فقط بعد بضعة أسابيع ولذلك يجب الحرص على استمرار علاجي. على الأغلب يتم تناول زيت، 3-4 مرات في اليوم تقريباً. من المحتمل أن يتغير عدد القطرات في كل تناول بحسب حالة طبية فورية أو بحسب نوع الزيت وتركيزه.

منتجات للتدخين أو للتبخير

هنالك عدة أشكال: أزهار، مسحوق أو لفائف جاهزة مسبقاً. يجب تناول الجرعة الموصى بها عن طريق الاستنشاق بعد وجبة طعام خفيفة (فاكهة أو ساندويش صغير) لمنع حصول انخفاض في مستوى السكر. سيتم الإحساس بالتأثير خلال بضع دقائق. من المفضل بين عملية استنشاق واستنشاق شرب مشروب بارد لمنع الشعور بحرقة في الحنجرة. من المحتمل أن يتم الإحساس بالتأثير فقط بعد بضعة أسابيع ولذلك يجب الحرص على استمرار علاجي. غالباً يتم تناول مُنتج تدخين، 3-4 مرات في اليوم تقريباً. من المحتمل أن يتغير عدد مرات الاستنشاق في كل تناول للمنتج، بحسب الحالة الطبية الفورية أو بحسب تركيز المواد الفعالة أو تصنيفها سائفاً/إنديكاً (يوم/ليلة) أو هجين المعد للاستعمال خلال كل ساعات اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يُمنع خلط أو إضافة أي مادة إلى محتويات مُنتج القنب. محتويات مُنتج القنب الطبي ملائمة للاستعمال وكل إضافة له قد تسبب ضرراً في النجاعة الطبية للعلاج.

إذا تناولت عن طريق الخطأ أكثر مما أنت قد تشعر بأعراض تسمم خطيرة التي تشمل دوار، نعاس، ارتباك، هذيان (هلوسات - رؤية أو سماع أمور غير موجودة) والإيمان بأمور غير صحيحة (أوهام)، قلق أو جنون الشك (زيادة في القلق أو الخوف)، تغييرات في وتيرة القلب المصحوبة بضغط دم منخفض (شعور بالدوار عند القيام).

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع/استنشاق كمية من المُنتج عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك. بعد تناول مفرط، يجب الالتقاء بالطبيب بهدف إجراء مراقبة.

يُمنع التسبب بتقيؤ بدون تصريح واضح من الطبيب.

إذا نسيت تناول المُنتج في الوقت المحدد، يُمنع تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب. يجب الاستمرار في تناول الدواء حسب توصية الطبيب.

بدء العلاج أو عند تغيير المُنتج/الجرعة. شرب الكحول أثناء العلاج بالقنب قد يزيد تأثيرات مختلفة مثل دوار، نعاس، فقدان التوازن أو إصابة في سرعة رد الفعل، مما يضعف القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات ويزيد احتمال خطر حدوث حالات سقوط وحوادث أخرى.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- يُمنع استعمال القنب إذا كنت حاملاً، تخططين أن تحملي أو مرضعة.
- يجب على النساء والرجال استعمال وسائل منع حمل ناجعة ضد الحمل أثناء العلاج بالقنب الطبي ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد إيقاف العلاج.
- عند الاستعمال خلال الحمل، من الممكن أن يكون وزن المولود قليل.
- خصوبة - من المحتمل حصول انخفاض في تعداد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال وإصابة في استيعاب الجنين لدى النساء.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة، يجب أن تستشيري طبيب أو صيدلي قبل استعمال الأدوية.

السياقة واستعمال الماكينات

- تبين الأبحاث بأن يوجد تأثير للمواد الفعالة في القنب على أوقات رد الفعل، تقييم الأوقات والمسافات والتصور المكاني.
- تعليمات السياقة واستعمال الماكينات هو بموجب أنظمة المواصلات في إسرائيل، يجب العمل بموجبها.
- الأطفال - يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

3. كيف تستعمل المُنتج؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطاقم الطبي. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي أو مع مندوب من مركز الإرشاد إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمنتج. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

هنالك عدة أشكال لإعطاء القنب: التدخين، التبخر، خلاصة زيت. من المفضل، قدر الإمكان، الوصول إلى توازن العلاج في الأدوية المُزمنة قبل بدء استعمال القنب الطبي.

الجرعة اليومية هي أمر شخصي جداً لكل متعالج ويحتاج إلى ملائمة عن طريق مراقبة الجرعة خلال ساعات اليوم (رفع الجرعة تدريجياً بهدف الوصول إلى الجرعة الأقل، التي توازن ما بين نجاعة طبية كبيرة وأعراض جانبية دنيا). الصبر! عملية الوصول إلى الجرعة الأمثل قد يستغرق بضعة أسابيع وحتى أكثر.

بدء استعمال مُنتج القنب الطبي:

1. يوصى بدء استعمال القنب الطبي أثناء التواجد في البيت.
2. يوصى البدء في استعمال القنب للمرة الأولى في أجواء مريحة وبوجود شخص بالغ مسؤول إضافي.
3. يجب البدء بالحد الأدنى من الجرعة ومراقبة التأثير. من المفضل إدارة قائمة مراقبة.

طريقة الاستعمال

زيت قنب طبي

- يجب تناول الزيت بعد وجبة خفيفة (فاكهة أو ساندويش صغير) لمنع حصول انخفاض في مستوى السكر.

- التهاب الشعب الرئوية المزمن وخلل في أداء الرئتين
- انخفاض في الهورمونات برولاكتين، FSH، LH و- GH
- اضطرابات في توازن الإلكتروليتات. مطلوب الحيطه والحذر لدى المرضى الذين يعانون من قصور الكلى
- اضطرابات ذهانية لدى متعالجين مع ماضٍ شخصي أو تاريخ عائلي مع هذه الأعراض.

أعراض جانبية إضافية المذكورة في الكتب العلمية وشيوعها غير معروف:
رد فعل تحسسي، التهاب مفاصل كانابينويد، اضطرابات في نظم القلب، قصور في القلب، انخفاض حرارة الجسم وفي الحركة، وفي حالات نادرة حتى شلل، هوس خفيف (فقدان قدرة الحكم، وسلوك سخيف).

أعراض جانبية النابعة عادة من فرط في الجرعة، التي تقتضي اهتماماً خاصاً:
فقدان الوعي، تغييرات كبيرة في ضغط الدم، في النبض، في مستوى السكر في الدم أو في وتيرة التنفس. جرعة كبيرة من هذا المنتج ممكن، في حالات معينة، لدى أشخاص ذات ميل مُسبق، أن تؤدي إلى هيجان مؤقت لحالات ذهان، قلق أو هلوسة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية. غير مذكورة في النشرة الطبية يجب عليك مراجعة الطاقم الطبي.

5. كيف يُخزن المنتج؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا المنتج، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال. وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة/المُلصق. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب تخزين المنتج في عبوة/قنينة محكمة الإغلاق، في مكان مظلم وجاف، في درجة حرارة أقل من 25°C.
- خلاصة زيت القنب صالحة للاستعمال لفترة تتراوح الشهر من يوم فتح القنينة.
- يُمنع إلقاء منتج القنب في سلة المهملات أو في مياه الصرف الصحي. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من هذا المنتج الذي لم تعد تستعمله.
- يُمنع تخزين أدوية/منتجات طبية أخرى في نفس العبوة.

6. معلومات إضافية

المنتج: بازليت نحوشتان م.ض.، ص.ب. 156، أور عكيفا.

بازليت فارما

مركز إرشاد قطري: 072-27-47-870

info@bazelet-n.com

موقع إترنت: www.bazelet-pharma.co.il

موافقة وزارة الصحة

حيازة المنتج ومكان الاستعمال:

يجب على المتعالج حمل الرخصة معه سويًا مع عبوة المنتج الأصلية بكمية لا تزيد عن عبوة واحدة أو أكثر من الكمية الشهرية المسموح بها بحسب الرخصة (الأقل من بينهما).
يُمنع الاستعمال بوجود قاصرين.
يُمنع حمل المنتج إلى خارج البلاد أو استعماله في مناطق جمر/مطارات وموانئ.
عند المكوث في المستشفى - يمكن الاستعمال فقط بعد موافقة الطاقم الطبي وفي المكان المُصادق عليه من قبل الطاقم.

التوقف عن الاستعمال:

يجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ القرار بإيقاف استعمال القنب بعد استعمال ثابت.

التوقف الفجائي عن الاستعمال قد يؤثر على النوم، الشهية أو الأحاسيس. من المحتمل ظهور أعراض انسحاب وفطام التي تشمل: قمل، عصبية، صداع، قلق، اكتئاب، حد تحفيز منخفض، صعوبات في التركيز، قلة نوم، اضطرابات في الشهية، الرغبة في استعمال المخدر. لذلك، ومن أجل منع أعراض الانسحاب والفطام والضييق، عند اتخاذ القرار في إيقاف العلاج بالقنب، سيُرشدك الطبيب في كيفية تقليص الاستعمال بصورة تدريجية حتى التوقف التام عن الاستعمال. يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال المنتج فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

استعمال القنب قد يسبب أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها. أغلب الأعراض الجانبية ستتوقف بعد التأقلم الأولي للمنتج.

أعراض جانبية شائعة:

- ضعف، دوام أو شعور بالتخليق
- نبض غير ثابت، تسارع دقات القلب
- انخفاض في مستوى السكر و/أو في ضغط الدم
- شهية متزايدة
- خلل في التناسق، انعدام الثبات، ضرر في التركيز
- تعب وشعور بالنعاس
- تغييرات في إدراك الوقت والفراغ، فقدان الذاكرة للمدى القصير
- تقلبات في المزاج، قلق
- سعال وجفاف في الحنجرة
- جفاف واحمرار في العينين
- صداع
- ألم بطن أو غثيان في حالة تناول المنتج على معدة فارغة
- أعراض جانبية عند الاستعمال الطويل/المزمن:
- تعلق، إدمان أو إساءة الاستعمال



מ/נ/ש
IMC-GMP
APPROVED



www.bazelet-pharma.co.il

Bazelet באזלת - קנאביס רפואי עד הבית